

X ISNIM CONGRESS & III SIPNEI CONGRESS

PROFILI INFIAMMATORI NEI DISTURBI DELL'UMORE E SCELTE TERAPEUTICHE

S. Pallanti, E. Burchi

Medico, specializzanda in Psichiatria, Università di Firenze – Italia

La correlazione tra disturbi dell'umore, disturbi d'ansia ed infiammazione è stata ben documentata in molti studi preclinici e di recente anche in setting clinici.

La specificità di questi reperti sostanzia la validità della corrente nosografia che differenzia tali disturbi e ne promuove una sottotipizzazione, costituendo un'opportunità per delucidarne la potofisiologia e sviluppare specifiche strategie terapeutiche.

Allo stato attuale, lo psichiatra clinico, tenendo conto del profilo citochinico e delle comorbidità infiammatorie del paziente, ha la possibilità di affrontare anche i disturbi resistenti e di terapie sempre più personalizzate.

INFLAMMATORY PROFILE IN ANXIETY AND MOOD DISORDERS AND THERAPEUTIC CHOICE

The correlation among Depressive disorders, Anxiety disorders and Inflammation has been documented in several preclinical works and more recently in clinical settings.

The specificity of these phenomena substantiates the current nosography and promotes sub categorizations, constituting an opportunity for researchers to deep into the pathophysiology of these disorders and develop new differentiated therapeutical approach.

To date, the clinical psychiatrist, taking into account the cytokinic profile and the inflammatory comorbidities, has to possibility to deal with resistant patients and opt for personalized drugs.

Bibliography:

Pallanti et al, BDNF and Artemin are increased in drug-naïve non-depressed GAD patients: preliminary data. Int J Psychiatry Clin Pract, 2014